

BiokaURTICA

Prírodný produkt obsahujúci extrakt zo Žihľavy dvojdomej (*Urtica dioica*).

Obsah: 100% extrakt zo Žihľavy dvojdomej (*Urtica dioica*).
Schválená základná látka v Európskej únii (EÚ No.1107 / 2009).

Výrobca: Bioka, s.r.o, Chorvátska 165, 900 81 Šenkvice, Slovenská republika

Číslo šarže: uvedené na obale

Objem balenia: uvedené na obale

Dátum expirácie: uvedené na obale

BEZ REZÍDUÍ

BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA:

Nie je žiadne nebezpečenstvo pre ľudské zdravie a životné prostredie.

P102: Uchovávať mimo dosahu detí.

P280: Noste ochranné rukavice/ochranný odev/ochranné okuliare/ochranu tváre.

P271: Používajte iba na voľnom priestranstve alebo v dobre vetranom priestore. Neaplikujte v blízkosti hladín tečúcich a stojatých vôd! Dodržujte ochrannú zónu! Dbajte o to, aby sa prípravok v žiadnom prípade nedostal do tečúcich a stojatých vôd vo voľnej prírode!

POPIS:

BiokaURTICA je vodný extrakt zo žihľavy dvojdomej (*URTICA DIOICA*), ktorý prirodzeným spôsobom aktivuje odolnosť rastlín proti patogénnym hubám a baktériám. Taktiež pôsobí proti žravému a cicavému hmyzu. Extrakt treba vždy aplikovať preventívne od jari do jesene v intervale 7 až 14 dní. Za vlhkého počasia alebo silného napadnutia sa odporúčajú kratšie intervaly postreku. Do postreku odporúčame použiť zmáčadlo.

NÁVOD NA POUŽITIE:

Insekticíd a akaricíd					
Plodina	Škodca	Rast, Fáza, Sezóna	Počet aplikácií	Aplikačný interval	Koncentrácia
Fazuľa, zemiaky*, ruže**	Rôzne druhy vošiek. Roztočec chmelový	od BBCH89 od BBCH49* začiatok leta**	1-5	7-15 dní	0,5-0,7 %
Šalát, kapustovitá zelenina, repka olejná, horčica, red'kovka	Rôzne druhy vošiek Blýskavec repkový Molička kapustová	Skorá jar BBCH49	1-6	7-15 dní	0,5-0,7 %
Ovocné a okrasné stromy	Rôzne druhy vošiek Obalovač jablčný	Jar, Leto Od BBCH87	1-5	7-15 dní	0,5-0,7 %
Vinič	Roztočec chmelový	Jar, Leto Od BBCH89	1-6	7-15 dní	0,5-0,7 %

Fungicíd					
Plodina	Choroby	Rast, Fáza, Sezóna	Počet aplikácií	Aplikačný interval	Koncentrácia
Zelenina: Uhorky Cukety Tekvicovitá zelenina Rajčiaky Zemiaky*	Múčnatka <i>Erysiphe polyg. oni</i> <i>Podosphaera xanthii</i> <i>Alternaria alternata f. sp. cucurbitate</i> <i>Alternaria solani</i> <i>Septoria lycopersici</i> <i>Phytophthora infestans</i> *	od BBCH89 od BBCH49*	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %
Kapustovitá zelenina	Alternariasp	Skorá jar BBCH49	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %
Ovocné stromy	Hrdza listov <i>Alternaria alternata</i> Hniloby hnedé <i>Monilinia laxata</i> <i>Botrytis cinerea</i> <i>Rhizopus stolonifer</i>	Jar, Leto Od BBCH87	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %
Vinič	Múčnatka, Peronospóra	Jar, Leto Od BBCH89	1-6	7-15 dní	0,2-0,5 %

PRÍPRAVA POSTREKOVEJ KVAPALINY:

Najlepšie výsledky sa získajú ak sa dodrží doporučená dávka a aplikácia sa uskutoční na obe strany listu. Aplikácia na list by nemala byť použitá, ak sú rastliny v plnom kvete. Produkt vlejte do postrekovača naplneného vodou do ½ objemu. Rozmiešajte a doplňte na požadovaný objem postrekovej kvapaliny, ktorá sa premiešava počas aplikácie.

Kompatibilita: V predstihu sa uistite, či výrobok je miešateľný pred skutočným zmiešaním. Nemiešajte s kyslými produktami.

PRVÁ POMOC:

Po zasiahnutí očí: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné šošovky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní a vyhľadajte lekársku pomoc. **Po zasiahnutí pokožky:** Umyte veľkým množstvom vody a mydla. **Po požití:** Nevyvolávajte zvracanie, vyhľadajte lekársku pomoc a ukážte túto etiketu. V prípade potreby konzultujte s Národným toxikologickým informačným centrom, UNB Bratislava, Limbová 5, 833 05 Bratislava, tel.: +421 (0)2 54-774-166.

SKLADOVANIE:

Produkt skladujte v originálnych uzavretých obaloch, v čistých, suchých a vetrateľných miestach pri teplote od + 5 do +25 °C. Prípravok chráňte pred mrazom a priamym slnečným žiarením. Pri dodržaní skladovacích podmienok je záruka v originálnych neporušených obaloch 3 roky od dátumu výroby.